

Ящур свиней.

В связи со вспышкой ящура свиней в Приморском и Хабаровском крае. Просим владельцам животных обращать внимания на состояние животных в личном подсобном хозяйстве.

Ящур свиней – быстро распространяющаяся и остро протекающая вирусная болезнь парнокопытных животных, характеризующаяся кратковременной лихорадкой, образованием пузырей (афт) и эрозий на слизистой оболочке рта, межкопытной щели, коже вымени и носового зеркала. Болеет и человек. Смертность среди молодняка составляет 80-100%, взрослых животных при злокачественной форме – 40-90%.

Этиология. Известны 7 серотипов возбудителя болезни вируса ящура: А, О, С, SAT 1, CAT 2, Cat 3, Азия и более 60 подвидов. В Европе обнаруживались исключительно серотипы А, О, С и Азия-1. Вирус ящура особенно хорошо размножается в клетках эпителия. При низких температурах, месяцами сохраняет вирулентность, поэтому зима — благоприятное время для распространения болезни. Ящур распространяется очень быстро из-за огромной контагиозности и способности заражать целые популяции чувствительных животных.

Источник инфекции – больные животные, а также особи, находящиеся в инкубационном периоде болезни, и уже переболевшие. Вирус выделяется во внешнюю среду с содержимым и стенками афт, слюной, мочой, выдыхаемым воздухом и фекалиями. Вирус могут переносить люди, все домашние животные, птицы и грызуны. Передается при контакте больных животных со здоровыми, а также через все предметы ухода, мясными продуктами, автомобилями, кормами зараженными вирусом. Возбудитель ящура может распространяться воздушно-капельным путем на десятки и сотни километров.

Клинические признаки. Хромота, исчезает аппетит, подавленный внешний вид, лихорадка (t выше 40.5 С), у поросят - сердечная недостаточность и гибель. Более поздний признак - в области копытец, на рыле, в ротовой полости, иногда на поверхности языка, коже молочной железы образуются везикулы диаметром до 30 мм. Отмечается интенсивное выделение слюны и чавканье. Через несколько часов или дней везикулы лопаются, образуя плоские язвы с темно-красным дном с остатками белых лоскутков. В течение следующих дней состояние улучшается, хромота уменьшается, животные начинают принимать корм. Примерно через 2 недели язвочки заживают, не оставляя следов. У супоросных маток могут быть выкидыши.

Переболевшие животные на протяжении всей жизни являются вирусоносителем, поэтому они подлежат сдаче на мясокомбинат. Животные павшие от болезни подлежат сжиганию.

При подозрении на заболевание ящуром следует немедленно вызвать ветврача и принять все меры по предотвращению разноса вируса: карантин, изоляция ящурного очага, дезинфекция помещений (1 раз в 3 дня), биотермическая обработка навоза, а также вакцинация здорового поголовья.

Материал подготовил Ветврач эпизоотолог Чиркова Е.И.