

Бешенство животных

Особо опасным смертельным заболеванием является бешенство (старое название водобоязнь). Оно вызывает тяжелые поражения органов центральной нервной системы у людей, и у животных. Вирус бешенства не щадит никого, болеют практически все виды наземных млекопитающих. Дикие и домашние животных (собаки, овцы, лошади, лисица, волк и др.), птицы, грызуны, летучие мыши, человек.

Бешенство регистрируется почти во всех странах. На данный момент бешенство утратило сезонный характер проявления и регистрируется круглогодично.

Способ заражения и механизм передачи возбудителя.

Заражение человека или домашнего питомца происходит при укусе больным животным или при попадании инфицированной слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку. Опасен контакт не только с "бешеным" животным, но и с животным вирусоносителем. Вирус в слюне выявляется за 8-10 дней до проявления явных клинических признаков болезни.

Инкубационный период

Длительность инкубационного периода, у животных составляет от недели до нескольких месяцев (иногда – лет), но уже за 5-10 дней до проявлений болезни животное является заразным.

Болезнь чаще протекает остро. Клиническая картина сходна у животных всех видов. Бешенство у них обычно проявляется в трех формах: буйной и тихой и атипичной.

При буйной форме животное резко возбуждено, агрессивно, грызет землю и различные предметы, стремится убежать. Часто больные животные неожиданно набрасываются на других животных или людей. В дальнейшем появляются конвульсивные припадки, которые постепенно учащаются, увеличивается их продолжительность. При этом отмечаются высокая температура, рвота, параличи отдельных групп мышц (глотки, гортани, конечностей), развивается косоглазие; нижняя челюсть отвисает, из пасти вытекает слюна; лай становится хриплым, заглушенным.

При тихой форме бешенства рано проявляются параличи, голос становится хриплым, затруднено глотание, отмечается сильное слюнотечение. У хозяина создается впечатление, что собака подавилась костью, он пытается извлечь ее из пасти, подвергая себя заражению.

Атипичная форма («атипичное бешенство») проявляется различными нетипичными для бешенства признаками. В последние 10 лет атипичные формы бешенства стали отмечать сравнительно часто. Болезнь характеризуется подострым или хроническим (до 2-3 месяцев) течением. Отмечаются истощение и атрофия мускулатуры. Зарегистрированы случаи бешенства, которые протекали только при явлениях геморрагического гастроэнтерита: рвота, полужидкий кал, содержащий кроваво-слизистые массы. Еще реже регистрируют abortивное течение болезни, завершающееся выздоровлением, и возвратное бешенство (после кажущегося выздоровления вновь развиваются клинические признаки болезни). При этом наблюдают вялость и безучастность животных, расстройства нервной, пищеварительной и других систем организма.

Заболевшие дикие животные ведут себя иначе, чем здоровые. Они перестают бояться людей, часто заходят в населенные пункты, фермы, нападают на людей и домашних животных.

Как нужно поступить при укусе животными? Очень важно научить ребенка (его родителей) правильно оказать себе и окружающим первую помощь при укусе.

Следует немедленно:

- 1). Интенсивно в течение 10-15 минут промыть рану водой с мылом, которая смывает слюну животного. Глубокие раны рекомендуется промывать струей мыльной воды, например, с помощью шприца. Не нужно прижигать раны.
- 2). Наложить на рану стерильную повязку.
- 3). Следует предупредить ребенка об опасности высасывания крови из раны ртом.
- 4). После этого в самые сжатые сроки надо обратиться в ближайший травматологический пункт или в любое медицинское учреждение (поликлинику, больницу, медицинский пункт). По возможности необходимо собрать максимум данных о покусавшем животном. Если животное домашнее и привито против бешенства, то необходимо взять с собой ветеринарную справку о сделанной прививке или регистрационное удостоверение с отметкой о прививке
- 5). Очень важно указать, что одновременно с обращением к врачу по поводу укуса необходимо принять меры в отношении укусившего животного (его надо привязать, изолировать) и вызвать ветеринарного врача для консультации. За внешне здоровыми домашними животными (собакой или кошкой) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок которого составляет 10 дней с момента укуса. Больное животное подлежит усыплению. Спасти его невозможно, так как бешенство животных не лечится.

Профилактики бешенства у домашних животных:

- идентификация и учет имеющихся животных у населения ;
- контроль над соблюдением правил содержания домашних животных;
- отлов бродячих собак и кошек;
- Продажа, покупка, а также перевозка животных в другие города или регионы разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства с отметкой о том, что животные вакцинированы против бешенства не более чем 12 месяцев. В трехдневный срок зарегистрировать приобретенное животное и сообщить о нем в ветеринарную станцию;
- в обязательном порядке ежегодно прививать своего питомца (старше 3 месяцев) против бешенства, лучше это делать в зимне-весенний период, особенно перед выездом на природу;
- Работники органов лесного и охотничьего хозяйства обязаны сообщать о подозрении на бешенство у диких животных, доставлять их трупы для исследования.

Важно помнить – методов лечения, как таковых – нет, и если запустить болезнь хотя бы до первой стадии, то иного исхода, чем летальный, скорее всего уже не будет. Бешенство животных и человека – смертельное заболевание.

Профилактические прививки на сегодняшний день остаются единственным надежным средством защиты людей и животных после укуса больным или заподозренным в заболевании бешенством

животным. Если врач назначил прививки, то их нужно начать делать немедленно, пропускать очередную прививку ни в коем случае нельзя.

Ветврач Чиркова Е.И.